

PRYSZCZYCA

Dzień dobry.

W związku z kolejnym pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

(z dnia 10 marca 2025 r.) informującym o odnotowanym w dniu 07 marca br. ognisku pryszczycy na terenie Republiki Węgier,

zwracam się z prośbą o ponowne poinformowanie wszystkich hodowców bydła, świń, owiec, kóz i podmiotów związanych w swej działalności

ze zwierzętami parzystokopytnymi o zaistniałej sytuacji.

W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zakazu wprowadzania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę, przesyłam również ulotkę

informacyjną Głównego Lekarza Weterynarii skierowaną do posiadaczy ww. zwierząt, celem przypomnienia o potencjalnych źródłach zakażenia

wirusem z rodzaju Aphthovirus, a także występujących objawach chorobowych u zwierząt.

W związku z wydanym Rozporządzeniem zwiększona została kontrola transportu zwierząt parzystokopytnych wjeżdżających m.in. na teren woj. śląskiego.

Na przejściu granicznym w Zwardoniu, w pow. żywieckim zamontowana została bramka dezynfekcyjna dla pojazdów przewożących zwierzęta parzystokopytne.

Przewidywany jest również montaż bramownicy na przejściu granicznym w Korbielowie.

Z poważaniem

--

Anna Chrzestek
Główny Specjalista ds. Zwierząt i IGO

**INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
DLA POSIADACZY BYDŁA, OWIEC, KOZ, ŚWIŃ ORAZ INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH
NA TEMAT PRYSZCZICY**



Pryszczycza (*Foot and mouth disease – FMD*) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, w tym **bydła, świń, owiec i kóz**.
Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony także przez człowieka, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu czy odzież.

Objawy chorobowe:

- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności;
- zwiększone pragnienie i obfite ślinienie;
- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzyrąbrowej, a także na wymieniu i strzykach;
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia;
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia;
- równie często dochodzi do padnięć zwierząt dorosłych.



